



Nutrition foliaire sur la betterave sucrière

L'objectif de l'essai

Augmenter le rendement de la betterave sucrière avec la nutrition foliaire.

Informations générales

Lieu: Italie
En association avec: COPROB
Variété: Marinella

Traitements

T0: Témoin non traité

T1: BMS MN: au semis: Microlan Zn 20 kg/ha

- Foliaire:
- Hyberol 2 L/ha (29/4/2017)
 - Hyberol 2 L/ha + Kappa M 4 kg/ha (19/5/2017)
 - Hyberol 2 L/ha + Kappa M 4 kg/ha (31/5/2017)
 - Fructol NF 2 kg/ha (12/6/2017)

Résultats

	RAD = Rendement	POL = Polarisation	SACC = Saccharose	K	Na
T0: Témoin	58,29	15,72	9,21	4,3	1,8
T1: BMS MN	58,35 (+0,1 %)	18,4 (+17 %)	10,73 (+16,5 %)	4,12 (-4,28 %)	1,88 (+4,9 %)

	N	PSD = Pureté	PLV = Rendement brut vendable
T0: Témoin	1,06	92,83	1640,83
T1: BMS MN	2,46 (+132 %)	92,79 (-0,05 %)	1998,81 (+21,82 %)

