FELDSALAT

Phenologische Stadien	1° Anwendung 10 Tage nach dem Aussetztender Setzlinge	2° Anwendung nach 5-7 Tagen	3° Anwendung nach 5-7 Tagen	4° Anwendung nach 5-7 Tagen	5° Anwendung evntl. 10 Tage vor Ernte
Blattdüngung	**Fructol® NF/Bio** 1,5Kg/2,5L+ **Hyberol®** 2L	**Fructol® NF/Bio** 2Kg/4L + **Chelal® Omnical** 2L	**Fructol® NF/Bio** 2Kg/4L + **Chelal® Omnical** 2L	**Fructol® NF/Bio** 2Kg/4L + **Chelal® Omnical** 2L + **Chelal® Mo** 0,5L	**Chelal® Mo** 0,8L

Die Aufwandmengen in der Strategie beziehen sich auf Kg/L je behandeltem Hektar; empfohlene Mindestwassermenge 400L/ha

Die Produkte Chelal Mo, Hyberol und Fructol Bio sind laut EU-Verordung im biologischen Landbau zugelassen

Der Zusatz von Chelal® Mo fördert die Nitratreduktase. Fällt die Ernte in die lichtarme Saison ist die Anwendung #5 sinnvoll. Siehe Thema Nitratreduktase

ERKLÄRENDE BEMERKUNGEN ZU DEN PRODUKTEN:

Fructol® NF/Bio ein N-P-K Dünger mit Spurenelementen, hoch an Magnesium und Bor, mit Molybdän verbessert die Nährstoffhomogenität der Kultur während der gesamten Saison.

Chelal® Omnical verbessert den Erhalt des Blattgrüns und verbessert das „Shelf- Live“. Da Kalzium maßgeblich an der Regelung des Wasserhaushalts der Pflanze mitverantwortlich ist, wirken Pflanzen welche optimale Gleichgewichte an Ca/K/N haben frischer. Die Kapazität des Wasserhaltevermögens der Zellen zeigt sich im Fall von Salat auch nach erfolgter Ernte. Gut versorgte Pflanzen zeigen sichtbar geringere Welkeerscheinungen.

Hyberol®, steigert die Resistenz der Pflanze bei vorhergesehen Frösten im Frühjahr bzw, Herbst. Die Präsenz von Bor senkt den Gefrierpunkt des Wassers in den pflanzlichen Zellen und verringert somit das Absterben der ansonsten erfrorenen Zellpartien.
Mehr zum Thema Hyberol- Frostschutz unter Newsletter Frostschutz

Hersteller: BMS Micro-Nutrients AG - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Belgien - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608 - www.chelal.com - Tel: 00.32.3.899.10.10
mail: info@chelal.com