CUCURBITACEA

ESTADIOS FENOLÓGICOS	Plantación	Primeras flores abiertas	Floración	Frutas mitad de tamaño	Frutas maduras
Riego	**Cultivos enarenados:** Aplicaciones durante toda la campaña. 0.5 kg **Chelal® Hydro NF** por semana en el riego por goteo (cada 2 semanas al inicio del cultivo) Hidroponía: **Chelal® Hydro NF** 1,2 kg + **Chelal B** 0,15 L en 100.000 L de solución nutritiva (aplicación continua)				
Productividad y Calidad	Mojar el cepellón con una solución de 200 gr **Fructol® NF**/hl	**Fructol® NF** 1,5 g/L (por vía foliar)		**Chelal® Noor** 1,5 g/L (*) + **Chelal® Omnical** 2 cc/L (por vía foliar cada 10-15 días, según el cultivo 2-4 tratamientos)	
Carencias de B y Mo (riego)	Mojar el cepellón con una solución de 5 cc **Chelal® Mo** + 200 cc **Chelal® B**/hl	(0,25 L **Chelal® Mo** + 2 L **Chelal® B**) o **Landamine BMo** 5 L			

Dosis y recomendaciones por ha. Por favor respectar las concentraciones máximas indicadas en el embalaje.

(*): eventualmente se puede substituir el Chelal Noor por el Fructol NF.

Fabricado por: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Bélgica - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608 - **www.chelal.com** - **info@chelal.com**
Distribución en España/Portugal: BMS Micro-Nutrients Iberica SL - C\ Alcalde Areny 6, com 2, 25002, Lleida, España - N° Verde: 900.99.32.22 - **iberica@chelal.com**
08.11.2018