ESPÁRRAGOS

ESTADIOS FENOLÓGICOS	En primavera (al suelo sol) Espárrago blanco: antes del acaballonado Espárrago verde: 25/30 días antes inicio cosecha	En verano (por vía foliar) Aplicar en 1000-1200 L de agua/ha	Final del verano (por vía foliar para reponer las reservas) Aplicar en 1000-1200 L de agua/ha
Carencia de Boro		2 aplicaciones de **Chelal® B** 1-1,5 L; primer aplicación 15-20 días después final cosecha repetir cada 15-20 días	
Tratamiento general (con abonado al suelo normal)	**Chelal® Zn** 2 L **Chelal® B** 1 L	**Fructol® NF** 3 x 2 kg; primer aplicación: final crecimiento vegetativo; segundo aplicación: inicio floración	2 x 3 L **Hyberol** (en las parcelas donde se hace estas aplicaciones no será necesario de hacer los tratamientos indicados de Chelal B y Chelal Zn en primavera)
Tratamiento general (con abonado al suelo reducido**)**	**Chelal® Zn** 2 L **Chelal® B** 1 L	3 x (1 kg **Chelal® RD NF** + 4 kg **Kappa G**); primera aplicación 15-20 días después final cosecha: repetir cada 15-20 días.	2 x 3 L **Hyberol** (en las parcelas donde se hace estas aplicaciones no será necesario de hacer los tratamientos indicados de Chelal B y Chelal Zn en primavera)

Las dosis son expresadas por ha. Respete las Concentraciones máximas indicadas en la etiqueta del producto.

Fabricado por: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Bélgica - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608 - **www.chelal.com** - **info@chelal.com**
Distribución en España/Portugal: BMS Micro-Nutrients Iberica SL - C\ Alcalde Areny 6, com 2, 25002, Lleida, España - N° Verde: 900.99.32.22 - **iberica@chelal.com**

09.11.2018