



Cachos visíveis



Cachos abertos



Botões florais separados

Floração



Alimpa



Cacho formado



Coloración de las frutas

ESTADIAS FENOLOGICAS

ESTADIAS FENOLOGICAS	Cachos visíveis	Cachos abertos	Botões florais separados	Floração	Alimpa	Cacho formado	Coloración de las frutas
Programa geral	1-2 kg Fructol® NF	2 kg Fructol® NF + 2 L Chelal® AZ			2 kg Fructol® NF + 2 L Chelal® AZ		
Adubação foliar		2 Kg Kappa G o 2 L Landamine Zn	2 Kg Kappa G o 3 L Landamine® Zn		2-6 x 4 Kg Kappa G o 2-4 x 4 L Landamine® Zn		
Desavinha	1 L Chelal® B		1 L Chelal® B				
Clorose férrica	1 - 2 L Chelal® Fe + Chelal RD NF 0,5 kg ⁽¹⁾	1 - 2 L Chelal® Fe + Chelal RD NF 0,5 kg ⁽¹⁾	1 - 2 L Chelal® Fe + Chelal RD NF 0,5 kg ⁽¹⁾		2 L Chelal® Fe ⁽¹⁾	Em caso de carência forte, repetir o último tratamento	
Dessecamento do cacho					3 L Chelal® Mg		3 L Chelal® Mg

Dosagem e recomendações por há. Por favor respeitar as concentrações máximas indicadas no embalagem.

(1): Eventualmente aplicar junto com o tratamento de Fructol®

Recomendamos de fazer cada 3-4 anos uma análises de terra (durante o Inverno, depois da colheita) e uma análises foliar depois da floração. É necessário de adaptar a fertilização da cultura, e esta programa foliar, em função do resultado destes análises. Para mais informações toma contacto com o nosso sevicio técnico.