POIVRON

Stades Phénologiques	Plantation	Premières Fleurs ouvertes	Floraison	Fruits de 2 cm	Premières fruits mûrs
En fertirigation	Cultures cultivé dans le sol: Applications pendant toute la campagne: 0,5 kg **Chelal® Hydro NF** par semaine dans le goutte à goutte (au début du cycle: tous les 2 semaines); Hors sol: (**Chelal® Hydro NF** 1,2 kg + **Chelal® B** 0,15 L) en 100.000 L de solution nutritive (application continue)				
Augmentation de la production	Mouiller les racines avec une solution de **Fructol® NF** 200 gr/hl	**Fructol® NF** 1,5 g/L (par voie foliaire)		**Chelal® Noor** 1 g/L ou **Fructol® NF** 1,5 g/L (par voie foliaire) tous les 10-12 jours (éventuellement ensemble avec **Chelal Alga P** 0,5 kg)	
Pourriture apicale				3-4 x **Chelal® Omnical** 1,5 L (par voie foliaire)	
Carences	**Chelal® B** 1-2 L			Quelques traitements de **Chelal® Mg** 2 -3 L **ou** **Chelal® Mn** 2 L	

Doses exprimées/ha. Respectez les concentrations maximales indiquées sur l'emballage.

Producteur et distribution en Belgique: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Belgique - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: BE0440.980.608
Tel: +32 3 899 10 10 - **www.chelal.com – info@chelal.com**
Distribué en France par: BMS Micro-Nutrients France SAS - Chez EXCO Valliance FP, 2 avenue Henry le Chatelier, BP60122, 33706 Merignac cedex, France
N° Vert: 0800 90 76 33 - **france@chelal.com**

20.03.2020